

<b>"Schattenzauber"</b>			
<b>Pflanzenbedarf für 100 m<sup>2</sup> (6,0 Pflanzen pro m<sup>2</sup>, 16,6 Zwiebeln pro m<sup>2</sup>)</b>			
<b>Name</b> [botanisch/deutsch]	<b>Empfohlener Mengenteil</b> [Stück/25 m <sup>2</sup> bzw. (100 m <sup>2</sup> )]	<b>Hinweise</b> [W: Winterwirkung durch Strukturen und Texturen oder wintergrüne Belaubung]	<b>Alternativart/-sorte</b>
<b>Gerüstbildner (einzeln verteilen)</b>			
<i>Clematis</i> 'Cote d'Azur' Waldrebe	3 (10)	Blüte im Spätsommer bis Herbst, azurblau, 100-150 cm, verholzender Halbstrauch	
<i>Cimicifuga rubifolia</i> Sommer-Silberkerze	3 (10)	weißer Sommerblüher, 150 cm	<i>Cimicifuga racemosa</i>
<i>Calamagrostis brachytricha</i> Diamant-Reitgras	5 (20)	grünlich-purpurne Rispen im Herbst, 100-120 cm, durchlässige Böden, Herbstfärbung, standfest im Winter	
<i>Hosta ventricosa</i> Glocken-Funkie	3 (10)	Blüte im Juli/August, violett, glänzend dunkelgrünes Laub; über Samen vermehrbar	
<i>Rodgersia</i> 'Die Stolze' Schaublatt	3 (10)	bronzefarbener Austrieb, glänzendes, kastanienartig geteiltes Laub, weiß-rosa Blüte im Juli, schöne rote Samenstände	<i>Rodgersia sambucifolia</i> 'Rothaut'
<b>Summe</b>	<b>17 (60)</b>	<b>10 %</b>	
<b>Begleitstauden (je 3 Stück gruppieren)</b>			
<i>Aster divaricatus</i> 'Tradescant' Weiße Wald-Aster	7 (30)	Spätsommerblüher, lange Blütezeit, niedrige, weiße Schleieraster, zierende Samenstände, dunkle Stängel, zarter als die Art	<i>Aster divaricatus</i>
<i>Kalimeris incisa</i> 'Blue Star' Schönaster	8 (30)	Hochsommerblüher, hellblauviolett, Dauerblüher	<i>Aster ageratoides</i> 'Ezo Murasaki' (kleine, blauviolette Blüten)
<i>Helleborus x hybridus</i> 'Sandra' (Orientalis-Gr.) Lenzrose	10 (40)	wintergrün, Frühblüher ab März	<i>Helleborus x hybridus</i> (weiße Töne)
<i>Persicaria amplexicaulis</i> 'J.S. Caliente' Kerzen-Wiesenknöterich	5 (20)	kräftig rote Blütenähren im Spätsommer und Herbst, kompakt, 50-60 cm	<i>Persicaria amplexicaulis</i> 'Atropurpurea'
<i>Polystichum aculeatum</i> Dorniger Schildfarn	5 (20)	wintergrün, [W], filigranes Laub, breit trichterförmiger Habitus	<i>Dryopteris affinis</i>
<b>Summe</b>	<b>35 (140)</b>	<b>23 %</b>	
<b>Füllpflanzen (kurzlebige und ggf. einjährige Arten)</b>			
<i>Aquilegia vulgaris</i> var. <i>stellata</i> 'Ruby Port' Akelei	8 (30)	kurzlebig, Blüte im Mai	<i>Aquilegia vulgaris</i>
<i>Pseudofumaria lutea</i> Gelber Scheinlerchensporn	10 (40)	sehr lange Blütezeit, versamt sich in Lücken, kurzlebig, filigranes Laub	
<b>Summe</b>	<b>18 (70)</b>	<b>12%</b>	
<b>Bodendeckstauden</b>			
<i>Epimedium x rubrum</i> 'Galadriel' Elfenblume	24 (100)	bildet kompakte Horste, rötlicher Austrieb, rote Blüte im April, rötlich braune Herbstfärbung, [W]	<i>Epimedium x rubrum</i>

<i>Heuchera</i> 'Palace Purple' Purpurglöckchen	18 (70)	dunkel braunrotes Laub, rosa-weiße Blütenrispen im Sommer, wintergrün, [W]	<i>Heuchera</i> Villosa-Gruppe, z.B. 'Mocha'
<i>Waldsteinia geoides</i> Ungarwurz, Waldsteinie	40 (160)	auffällige gelbe Blüte im April/Mai, horstiger Wuchs, Herbstfärbung bronze, [W]	
<b>Summe</b>	<b>82 (330)</b>	<b>55 %</b>	
<b>Blumenzwiebeln und -knollen; Pflanzung im Herbst</b>			
<i>Scilla siberica</i> Sibirischer Blaustern	240 (1000)	langlebige, versamende Zwiebelpflanze, nicht lästig	<i>Chionodoxa luciliae</i>
<i>Narcissus cyclamineus</i> 'Jetfire' Alpenveilchen-Narzisse	120 (500)	kräftig gelb blühende, zierliche Narzisse, sehr reichblütig	<i>Narcissus cyclamineus</i> 'Jack Snipe'
<i>Camassia leichtlinii</i> ssp. <i>suksdorfii</i> Leichtlins Präriellilie	20 (80)	Blüte im späten Frühjahr	<i>Camassia cusickii</i> 'Zwanenburg'
<i>Lilium</i> 'Claude Shride' (Martagon-Gruppe) Lilie	10 (40)	schwarzrote Blüte im Frühsommer, 120 cm hoch, exotische Wirkung	<i>Lilium</i> 'Russian Morning' (Martagon-Gr.) (dunkelpurpurrot, 85 cm)
<i>Lilium</i> 'Hyawatha' (Tigrinum-Gruppe) Lilie	10 (40)	Blüte im Juli, tief rot, exotische Wirkung, 110 cm	<i>Lilium</i> 'Salinas' (Orientalische Hybr.), Duft!

Einige der verwendeten Arten vertragen keine Trockenheit!

Konzeptentwicklung: Arbeitskreis Pflanzenverwendung